



## Памятка для пациента

### ДИМОЛЕГИН®

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

**Всегда носите эту памятку с собой!**

**Предъявляйте эту памятку каждому врачу, включая стоматолога, и любому другому медицинскому работнику, который оказывает Вам медицинскую помощь,**

**до начала лечения.**

#### **Информация для пациентов**

- Принимайте препарат ДИМОЛЕГИН® регулярно в соответствии с информацией, изложенной в Инструкции по медицинскому применению.
- Не прекращайте прием препарата ДИМОЛЕГИН®, не посоветовавшись с лечащим врачом в связи с риском возникновения тромботических осложнений.
- Учитывая механизм действия, применение препарата ДИМОЛЕГИН® может сопровождаться повышенным риском скрытого или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может приводить к постгеморрагической анемии.
- Риск развития кровотечений может увеличиваться, если у Вас есть неконтролируемая артериальная гипертензия и/или Вы применяете препараты, влияющие на гемостаз.
- Признаки, симптомы и степень тяжести кровотечения могут варьировать в зависимости от локализации, интенсивности или его продолжительности. Геморрагические осложнения могут проявляться в виде слабости, бледности, головокружения, головной боли или необъяснимых отеков, одышки, шока, развитие которого нельзя объяснить другими причинами. Вследствие анемии возможно развитие симптомов ишемии миокарда, таких как боль в груди и стенокардия. При применении антикоагулянтов возможно развитие вторичных осложнений по отношению к тяжелым кровотечениям, таких как синдром повышенного субфасциального давления и почечная недостаточность вследствие гипоперфузии.
- **Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас появились признаки или симптомы кровотечения.**

#### **Информация для медицинских работников**

- Препарат ДИМОЛЕГИН® – высокоселективный прямой ингибитор белка фактора свертывания Ха.
- Как и при применении других антикоагулянтов, необходимо тщательное наблюдение за пациентами, принимающими препарат, на предмет развития кровотечений. При развитии кровотечений прием препарата следует отменить.

- Риск развития кровотечений может увеличиваться у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией и/или при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз. Признаки, симптомы и степень тяжести могут варьировать в зависимости от локализации, интенсивности или продолжительности кровотечения. Геморрагические осложнения могут проявляться в виде слабости, бледности, головокружения, головной боли или необъяснимых отеков, одышки, шока, развитие которого нельзя объяснить другими причинами. Вследствие анемии возможно развитие симптомов ишемии миокарда, таких как боль в груди и стенокардия. При применении антикоагулянтов возможно развитие вторичных осложнений по отношению к тяжелым кровотечениям, таких как синдром повышенного субфасциального давления и почечная недостаточность вследствие гипоперфузии.
- В период лечения препаратом ДИМОЛЕГИН® проводить мониторинг параметров свертывания крови не требуется. Однако, при увеличении международного нормализованного отношения (МНО) или активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) более чем в 3,5 раза выше верхней границы нормы следует немедленно отменить препарат ДИМОЛЕГИН®.

**Заполните этот раздел или попросите лечащего врача сделать это.**

Имя, фамилия пациента: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Показание к применению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Доза: 60 мг 1 раз в сутки

Имя, фамилия врача: \_\_\_\_\_

Телефон врача: \_\_\_\_\_

При возникновении нежелательных реакций при применении препарата ДИМОЛЕГИН® обратитесь в:  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), 109012, г. Москва,  
Славянская площадь, д. 4, стр. 1, телефон: +7-800-550-99-03, электронная почта:

[pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru) или [npr@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:npr@roszdravnadzor.gov.ru), сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

ООО «Авексима Диол», Россия, 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский,  
п. Аякс, д. 10, помещ. 2-03; тел.: + 7 968 712-65-54; электронная почта: [Aveximadiol@aveximadiol.ru](mailto:Aveximadiol@aveximadiol.ru).